


# PROTOCOL PARODONTALE DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

T-Codes protocol onderdeel A



**De "Dutch Periodontal Screenings Index (DPSI)",** voorheen de gemodificeerde CPITN-index.

De DPSI-index is de hoogst gemeten DPSI-score van metingen in alle zes sextanten. Op grond van de vastgestelde index wordt de patiënt ingedeeld in categorie A, B of C.

Categorie A	DPSI-index 0	geen pockets dieper dan 3 mm. geen bloeding na sonderen. geen tandsteen. geen overhangende restauratie(s).
	DPSI-index 1	idem als bij index 0, maar wél bloeding na sonderen.
	DPSI-index 2	idem als bij index 1, maar met tandsteen en/of overhangende restauratie(s).
Categorie B	DPSI-index 3 Negatief	pockets van 4-5 mm met bloeding na sonderen, met tandsteen en/of overhangende restauratie(s). ZONDER waarneembare recessies(s) boven de verdiepte pocket(s)*.
Categorie C	DPSI-index 3 Positief	pockets van 4-5 mm met bloeding na sonderen, met tandsteen en/of overhangende restauratie(s). MET waarneembare recessie(s) boven de verdiepte pocket(s)*.
	DPSI-index 4	één of meer pockets van tenminste 6 mm diep, met bloeding na sonderen en met tandsteen en/of overhangende restauratie(s).

- \* Onder een "waarneembare recessie boven een verdiepte pocket" wordt verstaan: het visueel constateren dat OP DE PLAATS WAAR DE VERDIEPTE POCKET IS GEMETEN een gingivarecessie aanwezig is, zodat op die meetplaats de glazuur-dentinegrens zichtbaar is geworden. Recessiemaat is de meetwaarde in afstand tussen glazuur-dentinegrens en marginale gingivarand.

## Richtlijnen voor Parodontale Preventie

Voor tandheelkundige patiënten in DPSI-categorie A.

Indien een patiënt gescreend is vgl. de DPSI en blijkt tot categorie A te behoren, worden de volgende richtlijnen gehanteerd.

### Onderzoek

- I Het afnemen van een tandheelkundige, medische en psychosociale **anamnese**.
- II Het vaststellen van de mate van gingivale ontsteking dmv een **bloedingsscore**: met de pocketsonde wordt de sulcus rondom alle aanwezige gebitselementen gesondeerd en worden de locaties met bloedingen genoteerd (het scoren vindt plaats op zes vlakken per element, namelijk mesiobuccaal en -linguaal, distobuccaal en -linguaal, midbuccaal en -linguaal).  
Bloedingsscore berekenen:  $\frac{\text{'het aantal bloedende locaties'}}{\text{het totale aantal locaties}} \times 100\%$
- III Het vaststellen van het niveau van de mondhygiëne dmv een **plakscore**: tandplak wordt aangekleurd op alle aanwezige gebitselementen en de locaties met plak worden genoteerd (het scoren vindt plaats op dezelfde zes vlakken waar de bloedingsscore is bepaald).  
Plakscore berekenen:  $\frac{\text{'het aantal locaties met plak'}}{\text{het totale aantal locaties}} \times 100\%$
- IV Het vaststellen van de hoeveelheid tandsteen dmv een **tandsteenscore**: alle aanwezige gebitselementen worden gecontroleerd op tandsteen en de locaties met tandsteen genoteerd (het scoren vindt plaats op dezelfde zes vlakken waar de bloedingsscore is bepaald).  
Tandsteenscore berekenen:  $\frac{\text{'het aantal locaties met tandsteen'}}{\text{het totale aantal locaties}} \times 100\%$
- V Het beoordelen van restauratieranden in relatie tot eventuele **plakretentie**.
- VI Bij restauratieranden controleren of er voldoende "**biological width**" bestaat (minimaal 3 mm tussen bot-niveau en restauratierand).
- VII De **etiologie en behandeling** van gingivitis met de patiënt bespreken en een behandelplan opstellen.

### Behandeling

- I Patiënt motiveren en mondhygiëne instructie geven, waarbij de interdentale reiniging veel aandacht dient te krijgen.
- II Verwijderen van supra- en subgingivale plak en tandsteen.
- III Plakretentiefactoren (mn restauratieranden) waar nodig corrigeren.
- IV Polijsten.

### Evaluatie (na enkele weken/maanden)

- I Bloedingsscore maken.
- II Plakscore maken.
- III Tandsteenscore maken.
- IV Zonodig behandeling herhalen.

### Continuïteit

- I Jaarlijkse parodontale screening dmv DPSI.

